

藥品使用指導單

舒脈康[®]膜衣錠(Sevikar[®]5/40mg)

■ 藥品成分名

Amlodipine/Olmesartan

■ 藥品外觀

黃色圓形錠劑；標記：[C75]

■ 作用

治療高血壓。

■ 用法

本藥須由醫師處方使用，請依照醫囑按時服用，未經醫師許可請勿擅自停藥。

■ 注意事項

- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：曾對 Sevikar 其成分有過敏反應、對磺胺類藥物過敏、計畫懷孕、已懷孕或哺乳、肝腎功能不全。
- 服藥期間，如果要服用其他藥品（包括非處方用藥、維他命、健康食品、中草藥、疫苗、預防針等），應先諮詢醫（藥）師。
- 若為準備懷孕的婦女，需先跟醫師討論治療選擇，且一旦有懷孕須立即通知醫師。
- 一開始服藥可能會有頭暈現象，若發生此情況須告知醫師。水分攝取不足、過度出汗、腹瀉或嘔吐也可能造成血壓下降，引起頭暈甚至暈厥。
- 服用此藥物後若有需要使用鉀補充劑或含有鉀的鹽替代物前，應先諮詢醫療人員。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 如果您原本為一天一次服用此藥品，忘記服用時，可於原服藥時間的12小時內補服用；但如果已超過12小時，就不需要再補服藥品，等到隔天再服用即可。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請盡快通知醫師：噁心、嘔吐、頭暈、頭痛、疲倦、腹瀉。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：過敏反應（癢或起疹、臉或手部紅腫、嘴巴或喉嚨紅腫或刺痛、胸悶、呼吸困難）、水腫、排尿障礙、尿量減少。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C 以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 114.07
- PFS-7200-0263



衛教單意見回饋

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮