

藥品使用指導單

理曼提®內服液劑 (Rivast®Oral Solution)

■ 藥品成分名

Rivastigmine

■ 作用

- 治療輕度至中度阿滋海默型失智症
- 治療帕金森氏相關的輕度至中度失智症。

■ 用法用量

- 常用劑量為1.5毫克一日兩次，最多每日建議劑量為6毫克一日兩次。
- 醫師會根據目前的治療組合、治療效果與病人對藥物的耐受性做個人化的調整，請按醫囑服藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
- 依照以下步驟將藥品從附在包裝內之劑量管，自瓶中取出所需的劑量滴入口中，或與食物、一小杯水、果汁或氣泡飲料攪拌均勻後立即服用。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 注意事項

- 若有心臟相關疾病(如：房竇節疾病症候群、心臟傳導障礙、房室的傳導阻礙等)、氣喘、肺阻塞病史等情況須小心使用，請記得告知您的處方醫師以利評估用藥。
- 此藥可能會增加胃酸的分泌，也可能會惡化尿道阻塞或癲癇發作，此類病人必須小心使用，請記得告知您的處方醫師以利評估用藥。
- 如果終止服藥數天後重新服藥時，請告知您的處方醫師，評估是否重新從最低劑量開始，以避免如嚴重嘔吐之不良反應。
- 服用此藥可能會感到頭暈及嗜睡，若是需要持續開車或操作複雜機械時，其能力需定期由治療醫師作評估。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

每一個藥都有副作用，但不是每一個人都有可能有這些副作用，請勿驚慌。常見副作用如：噁心、嘔吐、頭暈、躁動、混亂或體重降低等，尤其容易發生在劑量調整的期間。

如果持續服用後仍出現任何讓您困擾的症狀，請立即停用並立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 開封後避免陽光直曬，室溫下可保存3個月，不須冷藏。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 114.12
- PFS-7200-8005

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮