

藥品使用指導單張

喜瑞樂®注射液劑 (Xolair® 150mg/mL/syringe)

■ 藥品成份名

Omalizumab

■ 藥品外觀

預充填注射針筒

輕微乳白色、無色至淺黃褐色溶液。



■ 用途與作用

- 治療6歲以上重度持續過敏性氣喘病人，18歲以上慢性鼻竇炎併鼻息肉病人，12歲以上慢性自發性蕁麻疹病人，作為附加治療。

■ 用法用量

- 只供皮下注射使用，由專業的醫療人員注射給予。劑量超過150 mg時，注射部位應該分成兩個以上。
- 過敏性氣喘患者，用法用量依個人的體重和血中IgE值而定，每二週或四週注射1-4次。
- 慢性自發性蕁麻疹患者，每回注射1-2次，每四週投予一回。

■ 注意事項

- 給藥後30分鐘內請密切觀察是否發生過敏反應，症狀包括發疹、呼吸困難、腫脹或暈倒。如果發生過敏反應，應儘速連絡醫師。
- 使用喜瑞樂®的病人亦曾發生其他特別的過敏反應(血清疾病)，症狀包括關節痛、僵硬、發疹、發燒、腫脹/淋巴結變大，一般發生在注射後的1至5天。若您在注射喜瑞樂®後有上述反應，請立刻連絡醫師。
- 請依照醫師囑咐持續使用。自行中斷或停藥可能會使氣喘或慢性自發性蕁麻疹症狀復發。
- 若有以下情型，請告知醫師：計畫懷孕、已懷孕、正在哺乳、有肝、腎疾病、自體免疫性疾病、是否曾經發生嚴重的過敏反應、是否在經常發生寄生蟲感染的地區居住或旅行、正在服用抗寄生蟲感染藥物。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

■ 罕見的副作用：

- 局部或全身性的過敏反應。如果發現突然出現過敏的症狀如皮膚紅疹、搔癢或蕁麻疹，臉部、嘴唇、舌頭或身體其他部位腫脹、心跳加快，頭暈和頭重，呼吸急促，哮喘或呼吸困難，請立刻告知您的醫師。
- 出血、瘀血之症狀。
- 關節出現某些下列症狀：疼痛、手腳麻木或刺痛，皮膚有腫塊或隆起的斑塊、虛弱或疲倦、食慾不振及體重減輕。
- 關節出現某些下列症狀：關節痛、僵硬，起疹、發燒、腫脹/淋巴結變大。通常發生在注射後1至5天。
- 如果您出現上述任何一項症狀，請立即告知您的醫師。

■ 其他可能的副作用：

- 頭痛。
- 注射部位反應，包括疼痛、腫脹、搔癢和發紅。
- 喉嚨痛、鼻塞、咽炎、肌肉骨骼痛、肌痛、關節痛。
- 頭暈、疲倦、噁心、腹瀉。
- 如果上述任何一項症狀對您影響甚鉅，請告知您的醫師。

■ 保存方法

請放在原包裝中置於2-8°C冷藏保存，不可冷凍。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130，8132

制訂單位 / 日期：藥劑部/115.02

PFS-7200-9004

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮