

# 藥品使用指導單張

## 杜避炎®注射劑 (Dupixent® 300mg/2mL)

### ■ 藥品成份名

Dupilumab

### ■ 藥品外觀

單劑量預填注射筆，含澄清至淡乳白色，無色至淡黃色的溶液

□ Dupixent® 300mg/2mL

□ Dupixent® 200mg/1.14mL



### ■ 適應症

■ 中度至重度異位性皮膚炎，中度至重度氣喘，慢性鼻竇炎合併鼻息肉結節性癢疹，嗜伊紅性食道炎，慢性阻塞性肺病，慢性自發性蕁麻疹

### ■ 用法用量



■ 杜避炎®預填注射筆可用於成人及2歲以上的兒童病人。  
■ 依醫囑劑量隔週注射一次。

### ■ 注射部位

■ 可選擇腹部(距肚臍5公分之外的區域)、上臂(外側中段)或大腿(前外側上1/3處)的皮下。  
■ 每次注射部位建議輪替，避免同一個部位重複注射。

### ■ 保存方法

■ 應置放在原有紙盒並儲存於冰箱2°C-8°C。  
■ 必要時，預填注射筆可置於室溫下不超過25°C最多達14天。超過14天應予以丟棄。  
■ 不可受熱或直接日曬/照光。  
■ 不可冷凍。不可震搖。



此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記使用藥品怎麼辦

- 若漏打一次劑量，應在漏打劑量後的 7 天內補行注射，之後則按照原有時程給藥。
- 若漏打劑量沒有在 7 天內注射，則應依照原有時程等到下次劑量再給藥。

## ■ 可能的副作用

- 過敏反應：全身性蕁麻疹、皮疹、結節性紅斑、過敏性休克等。
- 注射部位皮膚不適(紅斑、水腫、搔癢、疼痛及發炎)、結膜炎、眼瞼炎、口腔疱疹、角膜炎、眼睛癢、其他單純疱疹、乾眼症。
- 若注射後有以上症狀發生，或加重且持續數天，請告知醫(藥)師。

## ■ 注意事項

- 每次注射都應更換注射部位。
- 不可注射於皮膚壓痛、受傷、瘀青或結疤處。
- 注射前先將預填注射器從冰箱取出，不要拔除針蓋，使之回溫至室溫(45分鐘)。
- 注射前應以肉眼檢查是否出現顆粒及變色。若液體內有肉眼可見之顆粒、變色或呈現混濁則不得使用。若使用前藥品外觀破損或遭破壞，請勿使用。
- 杜避炎®無菌且不含防腐劑。任何未使用的部分應丟棄。
- 若您計畫懷孕、已懷孕、正在授乳、有使用其他藥品或保健食品，請主動告知醫(藥)師。
- 開始治療前及治療期間，不建議接種活性疫苗。若有可能接種疫苗，應在接種前先告訴醫療人員。
- 同時患有氣喘的病人，在未和醫療人員討論前，不得自行調整或停用氣喘治療藥物。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130·8132

制訂單位/日期：藥劑部/115.02

PFS-7200-9042

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮