

# 藥品使用指導單

## 泰莎樂®注射液劑 210 毫克(Tezspire® 210mg)

### ■ 藥品成分名

Tezepelumab

### ■ 藥品外觀

預充填式筆型注射劑。注射液為透明至半透明，無色至淡黃色的溶液。

### ■ 作用


12 歲以上嚴重氣喘病人的附加維持治療

### ■ 用法用量

- 每4週一次，每次皮下注射210毫克。

### ■ 注射部位

- 自行注射時，建議注射在腹部下方(距肚臍 5 公分以上)、大腿前側上 1/3 處。
- 由照護者注射時，可注射在上臂、大腿或腹部。
- 每次注射請選擇不同的部位，和前一次的注射部位至少要距離 3 公分。



### ■ 保存方式

- 每支注射器僅供單次使用。
- 請冷藏於2-8°C的冰箱中，並保存於原包裝盒中直到使用時再取出，以避免光線照射。
- 不可冷凍或振搖、請遠離高溫。
  - 在室溫(20-25°C)最多可保存30天。超過30天請立即丟棄。
  - 回復至室溫時，請勿放回冰箱冷藏。



此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。




以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 如何使用泰莎樂注射劑


- 使用前，自冰箱中取出後應等候60分鐘，回復到室溫。
- 取出預填式注射筆。握住預填式注射筆主體中段，從托盤中取出。
- 檢查注射筆名稱、有效期限、注射液顏色。
- 用肥皂洗手並用酒精棉片清潔注射部位，等待酒精乾燥。
- 請勿搨風或吹氣。請勿用手指碰觸針頭或推動橘色的針頭安全裝置。



1. 一手握住預填式注射筆主體，另一手小心拿掉保護蓋。此時會露出橘色的針頭安全裝置。(圖a)



2. 一手輕輕捏起注射部位的皮膚，將橘色的針頭安全裝置成90度角抵在皮膚上。(圖b)
3. 將針頭刺入您的皮膚，用力向下壓，直到看不到橘色的針頭安全裝置。(圖c)
4. 注射時，您會聽到**第一聲喀嚓聲**，表示注射已經開始。按住預填式注射筆**15秒鐘**，直到您聽到**第二聲喀嚓聲**。(圖d)



5. 完成注射後，筆直向上提起預填式注射筆。橘色的針頭安全裝置會向下滑出，鎖定到位將針頭蓋住。如果橘色柱塞桿沒有填滿檢視窗，表示您可能並未將劑量全部注射完畢。(圖e)
6. 每支筆針為單劑量，勿重複使用，請勿將保護蓋蓋回預填式注射筆，使用過的預填式注射筆及保護蓋應立即丟棄，放入不易刺穿的尖銳物品收集盒。其他使用過的用品，請放入家用垃圾中丟棄。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



## ■ 忘記使用藥品怎麼辦？

- 若您忘記施打泰莎樂，想到時請儘快補打。
- 若距離下次預定給藥時間太近，或不確定是否要補打，請聯絡醫(藥)師詢問。
- 切記不可一次注射雙倍劑量。

## ■ 可能的副作用

- 過敏反應: 皮疹 蕁麻疹、呼吸問題、發紅、發癢、腫漲或眼睛發炎、臉部、舌、口嘴腫脹、暈倒、暈眩、頭重腳輕...等等。
- 其他常見副作用包括：**喉嚨痛(咽喉炎)、關節疼痛(關節痛)、背痛**等。
- 若注射後有以上症狀發生，或加重且持續數天，請告知醫(藥)師。

## ■ 注意事項

- 若使用前藥品外觀破損或遭破壞，請勿使用。
- 泰莎樂不適用於治療急性氣喘症狀或急性發作。請勿使用泰莎樂治療急性支氣管痙攣或重積性氣喘。
- 開始使用泰莎樂治療後，請勿自行突然停用全身性或吸入性皮質類固醇。
- 接受泰莎樂治療的病人，應避免使用減毒活性疫苗。
- 勿重複使用同一支泰莎樂注射劑。
- 泰莎樂注射劑僅供皮下注射使用。
- 若注射部位有紅腫、疼痛，應避免注射此位置。如果症狀仍持續，應告知醫(藥)師。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/113.12
- PFS-7200-9052

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮