

藥品使用指導單張

瑞百安[®]注射液 (Repatha[®] 140mg)

■ 藥品成份名

Evolocumab 140mg/1mL/pen



■ 藥品外觀

注射筆針，內含澄清至乳白狀、無色至淡黃色的無菌注射液。

■ 作用

用於降低血液中的膽固醇，可作為飲食與藥物外的輔助治療。

■ 保存方法與注意事項

- 注射筆請放在冰箱中冷藏(2°C至8°C之間)，不可冷凍。不可搖晃。
- 避免暴露於過熱和日光直射的環境。
- 瑞百安注射筆的橘色蓋內含針頭蓋(位於蓋子內部)是使用乾燥天然橡膠製成，其原料為乳膠。如果您對乳膠過敏，請告訴醫護專業人員。
- 注射筆使用後請放入塑膠硬瓶中，返院時交給醫療人員處理，請勿隨意丟棄至家用廢棄物中。
- 瑞百安注射劑每支筆針僅供單次使用。

■ 使用前準備

- 每次使用前請用肥皂及清水將雙手清洗乾淨。
- 使用前，請先檢查您的注射筆名稱及有效期限。
- 以酒精棉片清潔注射部位的皮膚，等酒精乾後才可注射。

	
<ol style="list-style-type: none">1. 檢查視窗內的液體是否澄清，無色至淡黃色。2. 若出現藥物混濁或變色或有碎塊、碎片或顆粒，請勿使用。	<ol style="list-style-type: none">1. 將注射筆放於室溫下30-40分鐘使之回溫。2. 注射筆不可加熱，回溫後請儘速使用，勿再放回冰箱。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮


注射部位選擇

您可注射於左圖著色區域：

1. 上臂外側 (只適用於其他人為您注射時)
2. 腹部 (距離肚臍5公分以外的區域)
3. 大腿


每次注射都應更換注射部位。

使用酒精棉清潔注射部位。讓皮膚乾燥。




步驟 1：打開蓋子

1. 確定要施打前再拉開橘色筆蓋。
2. 橘色筆蓋拉開後不可再套回，以免損壞針頭。



步驟 2：壓下黃色安全蓋

1. 緊握注射筆並以90度角將黃色安全蓋壓入您的皮膚，直到黃色安全蓋完全看不見為止。
2. 若沒完全壓入，可能導致注射不完全。




步驟 3：按下灰色按鈕然後立即鬆開

1. 您會聽到第一聲喀噠聲，這表示已經開始注射。
2. 劑量窗口會開始轉變為黃色。



步驟 4：等待注射完成

1. 鬆開灰色按鈕後仍需將筆針抵住皮膚，注射時間需要大約**15秒**。
2. 當劑量窗口完全變成黃色後，表示注射已完成。
3. 拿開注射筆前，請先檢查劑量窗口是否變成黃色。



步驟 5：注射結束，移開筆針

1. 將注射筆垂直移開皮膚後，針頭會自動蓋起來。
2. 請勿搓揉注射部位。
3. 若您看到任何出血，請用棉球或紗布壓住該部位直到止血為止。
4. 請丟棄注射筆及筆蓋至堅硬防穿刺容器內，不可套回橘色筆蓋。



此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記使用藥品怎麼辦：

若漏打一次劑量，應盡快於漏打後7天內補打該次注射藥物，並依原注射時程繼續治療。若未能於漏打後7天內補打該次注射藥物，則不須補打，依原注射時程繼續治療。

■ 注意事項

- 若您為孕婦或哺乳中的婦女，不建議使用本藥品。
- 若您本身有肝腎方面之病史，請事先告知您的醫(藥)師。
- 本品不建議用於10歲以下的兒童。

■ 可能的副作用

- 常見副作用：注射部位不適(紅斑、疼痛、瘀青等)或類感冒症狀(鼻咽炎、上呼吸道感染、流行性感冒、背痛等)。
- 罕見副作用：過敏反應(血管性水腫)等。
- 若上述症狀持續且加重的話，請諮詢您的醫師(藥)師。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130，8132

制訂單位/日期：藥劑部/114.02

PFS-7200-9053

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮