

藥品使用指導單

必肺暢® 氣化噴霧劑 (Breztri® Aerosphere)






■ 藥品成分名

Budesonide 160 mcg、Glycopyrronium 7.2 mcg、
Formoterol fumarate dihydrate 5.0mcg，120 doses/btl

■ 作用

- 減少氣管發炎並使支氣管擴張，用於治療慢性阻塞性肺病。

■ 用法

	1. 第一次使用前，請先搖勻後按壓排氣，重複4次，以確保使用時吸入正確藥量。		2. 每次使用前，取下吸嘴保護蓋，確認吸嘴內是否有異物。
	3. 均勻搖晃吸入器5秒鐘。		4. 盡可能地呼出一口氣。將白色吸嘴放入口中，以嘴唇完整包覆吸嘴。
	5. 開始緩慢深吸氣，同時按壓吸入器頂部，使藥物噴出，持續吸氣至吸飽為止。		6. 移開吸入器，屏住呼吸10秒鐘後，緩慢吐氣。
	7. 休息30秒後， 重複步驟3-6 ，吸入第2劑。完成吸藥後蓋上保護蓋。		8. 以清水漱口，並將水吐掉。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主




以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 注意事項

- 如有以下情形，請先告知醫師：心血管疾病、肝腎功能不全、青光眼、白內障、甲狀腺病史、痙攣性疾病、慢性感染或感染未治療者。
- 若超過 7 天未使用，必須搖勻按壓 2 次測試噴霧。
- 每次使用後漱口，能有效降低聲音嘶啞及鵝口瘡等副作用的發生。
- 儲存於室溫25°C以下，避免潮濕環境或陽光直射。
- 若吸入器從鋁箔袋取出超過 3 個月請勿使用。





■ 如何知道藥品存量？

- 當指針指向黃色區域時，剩餘20次劑量，此時應準備回診。
- 指針指向紅色區域時，即應停止使用。
(此時按壓無法提供完整的劑量)



■ 如何清潔？

- 每週一次沖洗黃色啟動器，避免藥物累積阻塞。
- 請勿使藥罐受潮。

1. 取下藥罐 	2. 來回沖洗一分鐘 	3. 甩乾後靜置隔夜風乾 
4. 乾燥後裝回藥罐 	5. 安裝後，搖勻按壓排氣 2 次 	

■ 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130

■ 制訂單位/日期：藥劑部/114.04

■ PFS-7200-9054

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主

參考資料：

1. Micromedex

2. 藥品仿單



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮