

藥品使用指導單張

猛健樂®注射劑 (Mounjaro®KwikPen)

■ 成分

Tirzepatide

■ 藥品外觀

預充填、拋棄式筆型注射液，
含透明、澄清注射液。

有下列包裝：

- Mounjaro®2.5mg/0.6mL/dose ; 10mg/pen
- Mounjaro®5mg/0.6mL/dose; 20mg/pen
- Mounjaro®10mg/0.6mL/dose ; 40mg/pen



■ 作用


- 用於控制不佳的第二型糖尿病成人病人，作為飲食及運動之外的輔助治療。

■ 用法

- 每週皮下注射一次，可在一天中的任何時間注射，不論是否進食。
- 本藥須由醫師處方，請遵照醫囑使用。

■ 注射部位

- 可以將藥物注射到離肚臍至少 5 公分的腹部，大腿前側，或上臂後側。
- 每週注射部位建議輪替。您可以選擇身體相同區域，但請務必選擇該區域不同的注射部位。



a.正面

b.背面


此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 注射步驟

- 洗淨雙手，準備**猛健樂®**注射劑、酒精棉片及一個新的無菌針頭。
- 注射前，檢查注射筆中的溶液是不是透明無色。
- 以酒精棉片消毒注射筆橡皮頂端，及注射部位皮膚。

	<p>裝上針頭(每次注射都應使用新的無菌針頭)</p> <ol style="list-style-type: none">1. 撕下針頭保護封膜，垂直將針頭旋入橡皮頂端轉到固定為止。2. 移除針頭外蓋收好備用，取下內蓋並丟棄。
	<p>檢查排空(每次注射前，都應確實執行排氣動作)</p> <ol style="list-style-type: none">1. 旋轉劑量鈕，直到您聽到2聲喀擦聲並在視窗看到長線條。2. 針頭朝上並輕敲注射匣，使所有氣泡都能上升至針頭處。3. 按住給藥按鈕直到停止，並默數5秒。4. 針尖將流出少量藥物，表示您已排氣完成。“0”圖示必須顯示在劑量視窗中。
 <p>調撥</p>	<p>設定劑量</p> <ol style="list-style-type: none">1. 旋轉劑量旋鈕到底且劑量視窗顯示“1”圖示為止。2. “1”圖示等同於完整劑量。
 <p>推動 按住5秒</p>	<p>注射</p> <ol style="list-style-type: none">1. 將針頭刺入皮膚中。2. 按下劑量旋鈕直到停止為止，並默數5秒。在拔出針頭前，劑量視窗必須顯示“0”圖示表示注射完成。3. 完成後將針頭拔出您的皮膚，針頭尖端有一滴藥物是正常的。這不會影響到治療劑量。
	<p>移除並回收針頭</p> <ol style="list-style-type: none">1. 套回針頭外蓋，反方向旋轉以移除針頭。2. 廢棄針頭丟入針頭回收罐，交由醫療院所處理。3. 將筆蓋套回注射筆。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 忘記使用藥品怎麼辦？

- 如果錯過一劑藥物，應在4天(96小時)內儘快施打。
- 必要時可改變每週注射的日期，但兩次注射之間應至少相隔3天(超過72小時)。選定新的注射日之後，應持續每週注射一次。

■ 注意事項

- 計畫懷孕、已懷孕或哺乳期間，請勿使用此藥。計畫懷孕前至少兩個月應停用**猛健樂®**注射劑。
- 本身或家族有甲狀腺髓質癌病史，或罹患第二型多發性內分泌腫瘤症候群的病人，請勿使用此藥。
- 有糖尿病視網膜病變病史的病人，使用時應特別謹慎，密切監測視網膜病變情況是否惡化。
- 若注射部位有紅、疼痛、腫塊，應避免注射此位置。如果症狀仍持續，應告知醫師或藥師。

■ 可能的副作用

- 胃腸副作用，如噁心、腹瀉、嘔吐。大多數第二劑後腸胃道副作用會逐漸改善。若要改善噁心反胃的反應，建議減少餐點分量、避免油膩食物，或是覺得有飽足感就不再進食。
- 若腸胃道不良反應持續發生，請立即回診告知醫師。
- **猛健樂®**注射劑較不會造成低血糖，但若合併使用其他口服降血糖藥、胰島素時，就可能出現低血糖（症狀如：飢餓、發抖、心悸、嗜睡、冒冷汗、視力模糊、眩暈、心跳加快），此時請盡快食用果汁或方糖。嚴重低血糖可能會昏迷意識不清，則不可進食，應立即送醫。

■ 保存方式

- 未使用前，需存放於冰箱冷藏(2-8°C)，請勿冷凍。
- 開封使用後，可儲存於30°C以下，至多30天。
- 注射筆使用後，必須套回注射筆蓋，以避免光線照射。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130

制訂單位/日期：藥劑部 / 114.04, 114.11

PFS-7200-9055

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮