

藥品使用指導單

欣剋疹®帶狀疱疹疫苗 (Shingrix® Herpes Zoster Vaccine)

■ 接種目的

針對50歲以上的成人或是18歲以上具有罹患帶狀疱疹高風險的成人(孕婦則不建議施打)，預防帶狀疱疹及其相關併發症，如疱疹後神經痛。

■ 接種方法

僅供肌肉注射，理想的注射部位是三角肌。

初次接種時程共含兩劑，每劑0.5 mL；第二劑於第一劑施打2-6個月後施打。對免疫功能缺乏或受到抑制的人，第二劑可於第一劑施打1-2個月後施打。Shingrix可與未使用佐劑的季節性流感疫苗、23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)、肺炎鏈球菌結合型疫苗(PCV)或新冠疫苗同時施打於不同注射部位。請依醫師建議安排接種順序。

■ 可能導致之副作用

頭痛、腸胃道症狀(噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛)、肌痛、注射部位反應(疼痛、發紅、腫脹)。

■ 預期治療效果

為預防罹患帶狀疱疹及其併發症，建議完整接種兩劑欣剋疹®帶狀疱疹疫苗。

■ 藥品資訊

Shingrix Herpes Zoster Vaccine, 0.5 mL/dose

此疫苗為荷商葛蘭素史克藥廠製造，經衛福部核准進口並經食品藥物管理署檢驗合格封緘使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

■ 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130

■ 制訂單位/日期：藥劑部/114.07

■ PFS-7200-9058

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮