

# 藥品使用指導單張

## 週纖達®諾特筆

(Wegovy® 1.7mg/dose, 6.8mg/3mL/pen)

### ■ 成分

Semaglutide



### ■ 藥品外觀

預充填、拋棄式筆型注射液，含透明、澄清注射液

### ■ 臨床用途

肥胖與過重之體重控制(12歲以上)



### ■ 用法用量

每週施打一次，可在一天中任何時段注射，不論餐前或餐後。  
用量請以醫師處方為準。

時程	每週劑量
第1-4週	0.25mg
第5-8週	0.5mg
第9-12週	1mg
第13-16週	1.7mg
維持劑量	2.4mg

### ■ 注射部位

- 可選擇腹部(距肚臍 5 公分之外的區域)、上臂(外側中段)或大腿(前外側上 1/3 處)皮下。
- 每週注射部位建議輪替，避免同一個部位重複注射。



本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■操作方式

	<p><b>裝上針頭</b>(每次注射都應使用新的無菌針頭)：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 撕下針頭保護封膜，垂直將針頭旋入橡皮頂端轉到固定為止。</li><li>2. 移除針頭外蓋收好備用，取下內蓋並丟棄。</li></ol>
	<p><b>檢查排空</b>(使用新的注射筆前先檢查是否已排空)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 轉動劑量鈕至排空檢查符號。</li><li>2. 針頭朝上並輕敲注射匣，使所有氣泡都能上升至針頭處。</li><li>3. 按住給藥按鈕，直到劑量顯示器顯示 0，針尖應該會看到一滴溶液。</li></ol>
	<p><b>設定劑量</b> 轉動劑量鈕至需要的注射的劑量。</p>
	<p><b>注射</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 將針尖刺入皮膚。</li><li>2. 按住給藥按鈕，直到劑量計數器顯示 0。</li><li>3. 停留 6-10 秒後，再將針頭拔出，以確保劑量完整注入。</li></ol>
	<p><b>移除並回收針頭</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 套回針頭外蓋，反方向旋轉以移除針頭。</li><li>2. 廢棄針頭丟入針頭回收罐，交由醫療院所處理。</li><li>3. 將筆蓋套回注射筆。</li></ol>

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 注意事項

1. 若有意懷孕、已懷孕或哺乳期間，不建議使用本藥品，應告知醫師。  
治療期間建議避孕，計畫懷孕前至少兩個月應停藥。

### 2. 飲食：

- 1) 有飽足感或不餓時即可停止進食。
- 2) 多喝水和攝取高纖維食物可改善便秘。
- 3) 減少餐點份量，採少量多餐有助降低胃腸不適。

### 3. 可能副作用：

- 1) 常見為噁心、便秘、腹瀉、腹痛、嘔吐，通常是輕度或中度且短暫。  
如持續不適或症狀加劇，請告知醫師。
- 2) 在劑量遞增期間可能出現頭暈，如果發生頭暈，駕駛或操作機械須謹慎。
- 3) 如發現過敏反應、上腹劇痛、頸部腫塊、吞嚥困難、呼吸困難、聲音持續沙啞等症狀，請立即回診。

### 4. 忘記使用藥物怎麼辦？

- 1) 如果錯過一劑藥物，應在 5 天內儘快補打。
- 2) 超過 5 天，請跳過一劑，依原定日期施打下一劑。

## ■ 保存方式

- 未使用前，需存放於冰箱冷藏(2-8°C)，請勿冷凍。
- 開封使用後，可儲存於30°C以下，至多6週。
- 注射筆使用後，必須套回注射筆蓋，避免光線照射。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 114.11
- PFS-7200-9059

衛教單意見回饋



本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮