



可心歐 CAMZYOS 使用指導單

為何使用

可心歐
Camzyos 2.5 mg



[2.5mg/Mava]

可心歐
Camzyos 10 mg



[10mg/Mava]

治療症狀性阻塞型肥厚性心肌病變

- 肥厚性心肌病變會導致心肌壁增厚變硬，造成心臟充血困難。
- 可心歐可以減少心臟過度收縮和體內血流阻塞，藉此改善您的症狀與運動能力。

如何使用

依藥袋指示按時服用

- 請遵照醫師指示，每日口服一次。
- 請直接吞下整粒膠囊。請勿弄破、打開或咀嚼膠囊。
- 不可任意更改劑量或停藥。

注意事項



心臟超音波

因為可心歐會影響心臟收縮力，服藥期間必須定期接受心臟超音波檢查，以確保最佳劑量。



飲食與藥物限制

- 飲食限制：請避免飲用葡萄柚汁。
- 藥物限制：未經醫師/藥師評估，請勿自行開始、停用或改變任何處方藥、非處方藥或保健食品。



胎兒毒性

孕婦絕對不可使用，因會對胎兒造成傷害。





會影響可心歐藥效的藥物:

- 治療心律不整藥物 (Dronedarone)
- 治療心絞痛藥物 (Ranolazine)
- 抗血栓藥物 (Ticlopidine)
- 胃酸抑制劑 (Omeprazole, Esomeprazole)
- 癌症標靶藥物 (Enzalutamide、Apalutamide)
- 治療感染藥物 (Fluconazole, Clarithromycin, 抗結核病藥物, 抗病毒藥物)
- 治療癲癇與神經痛藥物 (Carbamazepine)
- 治療憂鬱與精神科藥物 (Fluvoxamine)

***以上並非完整清單，請務必告知醫師或藥師您使用的所有處方藥、非處方藥和保健食品。**



忘記服藥怎麼辦



服藥期間若原有心臟症狀惡化或出現新的不適症狀, 如: 呼吸急促(喘)、胸痛/胸悶、極度倦怠、心跳加速(心悸)、腿部腫脹，請立即就醫!

參考資料：Lexicomp, 可心歐仿單/病人用藥指引 (核准日期: 22-Aug-2025)
諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
制訂單位 / 日期：藥劑部/ 115.07.22
PFS-7200-0282



意見



本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主

以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮