



吸入劑使用指導單

吸必擴氣化噴霧劑 Symbicort Rapihaler

(Budesonide 160 mcg / Formoterol 4.5 mcg)

為何使用


慢性阻塞性肺病及氣喘的維持治療

如何使用

使用時間：請依藥袋指示使用

初次使用：上下搖5秒後，對空按壓1次，重複2遍

簡單五字訣：搖→吐→吸→閉→漱



🔔 若醫師開立「2噴」，則在吸完一次後，間隔 30 秒再重複步驟1-4。(並非連續按壓兩下)

注意事項

- 使用後漱口可避免聲音嘶啞及口咽念珠菌病感染(鵝口瘡)
- 開封三個月後，或計數器達到0 時(紅色區域)，應丟棄
- 請以乾淨的酒精棉片或衛生紙擦拭吸嘴即可
- 存放於室溫30°C以下乾燥陰涼處
- 已知對本藥品成分過敏者，**請勿使用**
- **不可自行停藥**



藥品劑量計數器

請依醫師指示規律用藥，避免停藥致症狀復發，或過量增加心血管風險

可能的副作用

- 若出現以下症狀，請於回診時諮詢醫師
鼻咽炎、頭痛、口咽念珠菌病、上呼吸道感染、肺炎、心跳加快、血壓升高、視力模糊、排尿困難
- 若發生過敏反應，請停用並回診告知醫師
例如全身性過敏、血管性水腫、皮疹和蕁麻疹



影片



意見