



鼻噴劑使用指導單

常用藥品介紹

☐ 噴立停
Azetin
140mg



☐ 帝伏寧
Dufanas
137/50mg



☐ 碧適清
Besonin
64mg



☐ 特索寧
Trisonin
55mg




為何使用

改善過敏性鼻炎

如何使用

使用時間：請依藥袋指示使用。 ※簡單五字訣：擤→搖→噴→吐→擦

擤



使用前
請先將鼻涕擤出

搖




上下充分搖勻
取下防塵蓋
(首次使用先排氣)

噴



噴頭放入一側鼻孔
傾向外側，吸氣同時按一下
(另一側鼻孔以手指壓住)

吐



移出噴頭
嘴巴慢慢吐氣
另一側鼻孔重複

擦



請用乾紙巾擦拭噴頭
立即蓋上防塵蓋

🔔 若醫囑「噴2下」，請先左右各噴一次，稍作休息後重複3、4步驟（請勿連續按壓2下）

注意事項

- 首次使用或超過14天未使用，請先排氣。（對空按壓至均勻藥霧出現）
- 用藥後10 - 15分鐘內，盡量避免擤鼻子。
- 含類固醇鼻噴劑通常需要持續使用 1 至 2 週，症狀才會明顯改善。
- 每瓶鼻噴劑提供 120 噴，請於室溫25°C以下保存，開封後使用期限為3個月。
- 若預備懷孕、懷孕中或正在哺乳，使用前請先與醫師討論。

可能的副作用

- 流鼻血、鼻腔乾燥、鼻潰瘍、頭痛。
- 若發生持續大量流鼻血、過敏反應，或視力變化，請停藥並立即回診。



影片



意見