



吸入劑使用指導單

適喘樂舒沛噴吸入劑Spiriva Respimat (Tiotropium 2.5mcg)

為何使用


慢性阻塞性肺病及氣喘的維持治療

如何使用

使用時間：請依藥袋指示使用

初次使用：安裝藥罐、排氣三次


簡單五字訣：轉→開→吐→吸→閉



🔔 間隔 30 秒後，重複 1 至 5 步驟。吸滿「兩噴」才算完整的一劑。

注意事項

- 安裝藥罐時先拔底座，藥罐窄端推入後，用力下壓到底發出「卡塔」聲。
- 初次使用請先朝地執行「轉、開、噴」，見霧後再重複 3 次。
- 本吸入劑可提供 60 噴（30個劑量）。
- 開封三個月後，或劑量顯示器指示為 0 時應丟棄。
- 請以乾淨的酒精棉片或衛生紙擦拭吸嘴即可。
- 存放於室溫30°C以下乾燥陰涼處。
- **請依照醫師指示用藥，不可自行停藥，以免症狀復發；亦不可超過建議使用頻率。**



可能的副作用

- **若出現以下症狀，請於回診時諮詢醫師**
口乾、頭痛、視力模糊、排尿困難、鼻咽炎、心跳加快
- **若發生過敏反應、胸痛或呼吸惡化，請立即就醫**

