



吸入劑使用指導單

昂帝博吸入膠囊Ultibro Breezhaler

(Indacaterol 110mcg / Glycopyrronium 50mcg)


為何使用

慢性阻塞性肺病的維持治療

如何使用

使用時間：請依藥袋指示使用

簡單五字訣：開→刺→吐→吸→閉



- 打開裝置
- 放入膠囊並關上

- 手按兩側按鈕
- 按壓刺破膠囊
- 放開按鈕

慢慢吐氣，
把氣吐完。
(不可對吸嘴吐氣)

- **用力深吸5秒**
- 聽到呼呼聲音

※ 吸藥時身體直立
勿將膠囊內藥品傾倒出

移開吸入器、
緊閉雙唇
閉氣5-10秒

🔔 ✓ 吸完檢查膠囊是否有殘留 ✓ 有殘留可再吸一次，重複 3 至 5 步驟。

注意事項

- 請依醫師指示規律用藥，**不可自行停藥**。
- 膠囊易吸潮，應存放在鋁箔片中，使用前再取出。請勿吞服膠囊。
- 使用後請以酒精棉片或衛生紙擦拭吸嘴即可。
- 請存放於室溫30°C以下乾燥陰涼處。吸入器使用30天後應丟棄。
- 已知對本藥品成分過敏者，**請勿使用**。

可能的副作用

- **若出現以下症狀，請於回診時諮詢醫師**
咳嗽、鼻咽炎、口乾、頭痛、心悸、排尿困難、青光眼症狀惡化
(眼痛、視力模糊)
- **若發生胸痛、嚴重過敏反應或呼吸惡化，請立即回診告知醫師**

