



吸入劑使用指導單

肺樂喜易利達乾粉吸入劑Trelegy Ellipta

(fluticasone furoate 92mcg / umecclidinium 55 mcg / vilanterol 22mcg)



為何使用

慢性阻塞性肺病及氣喘的維持治療

如何使用

使用時間：請依藥袋指示使用


簡單五字訣：開→吐→吸→閉→漱



🔔 僅在準備吸藥時開蓋；若開蓋後未吸就關上，會浪費一次劑量。

注意事項

- 使用後漱口可避免聲音嘶啞及口咽念珠菌病感染(鵝口瘡)
- 開封一個月後或計數區塊為紅色時應丟棄
- 請以乾淨的酒精棉片或衛生紙擦拭吸嘴即可
- 存放於室溫30°C以下乾燥陰涼處
- 有嚴重乳蛋白過敏，或已知對本藥品成分過敏者，請勿使用
- 不可自行停藥



請依醫師指示規律用藥，避免停藥致症狀復發，或過量增加心血管風險

可能的副作用

- 若出現以下症狀，請於回診時諮詢醫師
鼻咽炎、頭痛、口咽念珠菌病、上呼吸道感染、肺炎、心跳加快、血壓升高、視力模糊、排尿困難
- 若發生過敏反應，請停用並回診告知醫師
例如全身性過敏、血管性水腫、皮疹和蕁麻疹



影片



意見