



吸入劑使用指導單

艾能舒吸入膠囊Enerzair Breezhaler

(Indacaterol 150mcg / Glycopyrronium 50mcg / Mometasone furoate 160mcg)

為何使用

氣喘的維持治療

如何使用

使用時間：請依藥袋指示使用

簡單五字訣：開→刺→吐→吸→漱



開



刺




吐




吸




漱




- 打開裝置
- 放入膠囊並關上



- 手按兩側按鈕
- 按壓刺破膠囊
- 放開按鈕




慢慢吐氣，
把氣吐完。
(不可對吸嘴吐氣)



- **用力深吸5秒**
- **閉氣5-10秒**

※ 吸藥時身體直立
勿將膠囊內藥品傾倒出



吸完請以清水
漱口至少2次
並吐掉

🔔 ✓ 吸完檢查膠囊是否有殘留 ✓ 有殘留可再吸一次

注意事項

- **使用後漱口可避免聲音嘶啞及口咽念珠菌病感染(鵝口瘡)**
- 請依醫師指示規律用藥，**不可自行停藥**。
- 膠囊易吸潮，應存放在鋁箔片中，使用前再取出。請勿吞服膠囊。
- 使用後請以酒精棉片或衛生紙擦拭吸嘴即可。
- 請存放於室溫30°C以下乾燥陰涼處。吸入器使用30天後應丟棄。
- 已知對本藥品成分過敏者，**請勿使用**。

可能的副作用

- **若出現以下症狀，請於回診時諮詢醫師**
咳嗽、鼻咽炎、口乾、頭痛、心悸、排尿困難、青光眼症狀惡化
(眼痛、視力模糊)
- **若發生嚴重過敏反應、胸痛或呼吸惡化，請立即回診告知醫師**



影片



意見