



注射劑使用指導單

猛健樂筆Mounjaro KwikPen

(Tirzepatide 2.5mg / 5mg / 10mg)

為何使用

第二型糖尿病之血糖控制；體重控制

如何使用

使用時間：每週皮下注射一次

簡單五字訣：裝→排→轉→注→收



☐ 10mg



☐ 5mg



☐ 2.5mg




裝

排


轉

注


收



調撥



按住5秒



酒精消毒注射筆頂部
裝上新的針頭
(保留外蓋備用)

劑量鈕**轉 2 下**
筆朝上並輕彈
按鈕按到底排空

旋轉劑量鈕
至醫師指示施打的量


酒精消毒皮膚
注射筆垂直插入
按鈕按到底
停留約 5 秒

套回針頭外蓋
移除針頭**丟入回收罐**
交由醫療院所回收

🔔 針頭的綠色內蓋必須移除後才能施打；每次都要執行排空。

注意事項

- **注射部位：腹部、大腿或上臂，每次更換注射位置。**
- 冷藏2-8°C或室溫30°C以下保存，室溫保存至多30天。
- 忘記注射：4天（96小時）內可補打；兩次注射之間應至少相隔3天（超過72小時）。
- 計畫懷孕前至少兩個月應停用猛健樂。已懷孕或哺乳期間，請勿使用。
- 每支注射筆有殘餘藥量無法施打屬於正常現象，請依醫師指示規律用藥。



可能的副作用

- 噁心、腹瀉、嘔吐，通常會逐漸改善，建議減少餐點分量、避免油膩食物。
- **若發生過敏反應，或出現劇烈腹痛、持續嘔吐、視力變化、嚴重低血糖症狀，請停藥並立即回診**

