



鼻噴劑使用指導單

艾敏釋鼻用噴液懸浮劑Avamys

(Fluticasone furoate 27.5mcg/dose)



為何使用

改善過敏性鼻炎

如何使用

使用時間：請依藥袋指示使用

簡單五字訣：擤→搖→噴→吐→擦

擤




使用前
請先將鼻涕擤出
清理鼻腔

搖




上下用力**搖 10 秒**
取下防塵蓋
首次使用先排氣

噴




噴頭放入鼻孔
朝鼻翼側
輕輕吸氣同時按壓

吐



移出噴頭
嘴巴慢慢吐氣
另一側鼻孔重複

擦



請用乾紙巾擦拭噴頭
立即蓋上防塵蓋

🔔 若醫囑「噴 2 下」，請先左右各噴一次，稍作休息後重複 3、4 步驟（請勿連續按壓 2 下）

注意事項

- 首次使用、超過30天未使用，或5天未加蓋，請先排氣。
(對空按壓至少 6 次，至均勻藥霧出現)
- 用藥後10 - 15分鐘內盡量避免擤鼻子。
- 請於室溫30°C以下保存。
- 本鼻噴劑可提供120次噴霧。要檢查還剩下多少藥物，請垂直拿着鼻噴劑背向光源，透過窗格察查看剩餘藥物的液體水平。
- 若預備懷孕、懷孕中或正在哺乳，使用前請先與醫師討論。



可能的副作用

- 流鼻血、鼻腔乾燥、鼻潰瘍、頭痛。
- 若發生持續大量流鼻血、過敏反應，或視力變化，請停藥並立即回診。

