



吸入劑使用指導單

肺舒坦耐舒樂乾粉吸入劑Foster Nexthaler

(Beclometasone 100mcg/Formoterol 6mcg)


為何使用

慢性阻塞性肺病及氣喘的維持治療

如何使用

使用時間：請依藥袋指示使用

簡單五字訣：開→吐→吸→閉→漱



🔔 吸入藥劑時，您可能察覺到有味道、聽到「喀」一聲。
若需吸入第二劑，請休息30秒後，重複一～四步驟。

注意事項

- 使用後漱口可避免聲音嘶啞及口咽念珠菌病感染(鵝口瘡)
- 開封六個月後，或計數器窗口顯示為「0」時應丟棄
- 請以乾布或紙巾擦拭吸嘴即可，務必保持乾燥
- 存放於室溫25°C以下乾燥陰涼處
- 有嚴重乳蛋白過敏，或已知對本藥品成分過敏者，請勿使用
- 不可自行停藥。



請依醫師指示規律用藥，避免停藥致症狀復發，或過量增加心血管風險

可能的副作用

- 若出現以下症狀，請於回診時諮詢醫師
鼻咽炎、頭痛、口咽念珠菌病、上呼吸道感染、肺炎、心跳加快、血壓升高、視力模糊、排尿困難
- 若發生過敏反應，請停用並回診告知醫師
例如全身性過敏、血管性水腫、皮疹和蕁麻疹

