

# 藥品使用指導單

## 氣舒痰<sup>®</sup>液(Bisolvon Solution)

### ■ 藥品成分名

Bromhexine

### ■ 作用

氣舒痰液可用於化痰。其中成分Bromhexine 可減少痰液黏稠度和活化呼吸道纖毛上皮細胞而加強痰液的清除，進而促進排痰和緩解咳嗽。

### ■ 用法

#### 1. 口服

(1)成人、14歲以上兒童：每次4-8ML，每日三次。

(2)6~14歲小兒：每次4ML，每日三次。

(3)6歲以下幼兒：每次2ML，每日三次。

開始治療時，成人每日總計量可能增加至48毫克。

#### 2. 吸入(使用噴霧裝置)

需以生理食鹽水1:1比例稀釋，為了避免沉澱混合後請立刻使用。

吸入前建議將溶液溫熱至體溫。

(1)成人及6歲以上兒童：每次4ML，每日二次。

(2)2-6歲兒童：每次2-4ML，每日二次。

(3)2歲以下兒童：每次2ML，每日二次。

### ■ 注意事項

- 吸入和口服合併治療可加強效果，尤其適用於治療初期需快速達到完全效果的病人。
- 本藥品服藥之初會使痰液量排除增加，咳嗽可能會稍微加劇。
- 用於急性呼吸道適應症時，若症狀在治療期間未能改善或惡化，應盡速就醫諮詢。
- 對Bromhexine 或製劑中其他成分過敏者不適合使用。
- 如有罕見遺傳疾病不適合此品之賦形劑時，應避免使用。
- 雖無跡象顯示藥品對生育力影響，但懷孕期間仍最好避免使用。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

每一個藥都有副作用，也不是每一個人都有可能有些副作用。極少數報告有發生多形性紅斑、史蒂文生氏-強生症候群等嚴重皮膚損害，因此如出現皮膚或黏膜出現新傷口、皮膚紅疹、腹瀉、腹痛、或皮膚過敏，請立即與您的醫療人員聯繫。

## ■ 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/2021.01
- PFS-7200-8001

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮