

# 藥品使用指導單

## 帝拔癲<sup>®</sup>液 (Depakine Solution)

### ■ 藥品成分名

Valproate Sodium.

### ■ 作用

1. 抗癲癇 (癲癇之大發作、小發作、混合型及顛葉癲癇。)
2. 情緒穩定劑

### ■ 用法用量

1. 每瓶帝拔癲口服液隨藥附有一支有劑量(mg)刻度指示的調劑針筒，應以少量非發泡性飲料稀釋後服用，建議與餐點同時服用。
2. 每24小時平均劑量如下：
  - 孩童：30 mg/kg (建議使用口服液劑)。  
一歲以下可分兩次服用。一歲以上可分三次服用。
  - 青少年及成人：20~30 mg/kg (建議使用錠劑或持續錠之劑型)。  
最多每公斤每日60毫克。
3. 醫師會根據目前的治療組合、治療效果與病人對藥物的耐受性做個人化的調整，因此請按醫囑服藥，勿自行增減藥量或任意停藥。

### ■ 注意事項

- 請依照指示使用藥物。
- 藥品可能造成嗜睡或注意力減低。
- 服用本品患者宜事前先檢查肝功能，並持續定期追蹤。
- 治療期間不建議服用酒精性飲料。
- 使用本品可能會導致重大的先天性畸形，特別是神經管畸形，且可能會使胎兒智商下降，故本品應僅限用於無法以其他藥物控制症狀，或有其它原因無法使用其他藥物治療之孕婦。
- 女性病人都應針對懷孕的可能進行評估。治療期間建議採取有效的避孕措施。當發現懷孕時應緊急通知醫師。
- 如同時有在使用其它藥品如：抗憂鬱劑、抗精神病藥、mefloquine、chloroquine、bupropion和tramadol，請告知您的醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

每一個藥都有副作用，也不是每一個人都有可能有這些副作用。常見副作用如：眩暈、頭痛、嗜睡、倦怠、視力模糊、肌肉無力或震顫。

如果開始服用後出現任何讓您困擾的症狀，請立即停用並立刻與您的醫療人員聯絡。

## ■ 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/2021.01
- PFS-7200-8002

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮