

藥品使用指導單

胃立舒泰[®]懸濁液 (Ulstal[®])

■ 藥品成分名

Aluminium Hydroxide gel/Magnesium Hydroxide/Oxethazaine

■ 作用

中和胃酸緩解胃痛。

■ 注意事項

- 使用前請先振搖均勻。
- 孕婦、哺乳婦女、12歲以下之孩童不建議使用。
- 腎衰竭患者不建議使用。
- 服用過量可能會造成暈眩、嗜睡的情形。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

每一個藥都有副作用，也不是每一個人都有可能有這些副作用：皮膚紅疹、搔癢、便秘、噁心、嘔吐、腹瀉。

■ 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/2021.01
- PFS-7200-8008

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮