

藥品使用指導單

陰道栓劑的使用方法

■ 用法

1. 用肥皂及清水充分清潔雙手。
2. 打開栓劑外包裝（封套）。
3. 若使用送藥器，將栓劑較小的一端放入送藥柱之杯形尾端。
4. 仰臥彎曲雙腿，輕輕的將送藥器插入陰道，而深度以能順利插入即可。輕輕的壓送藥器以使栓劑推送入陰道後，將送藥器從陰道取出。
5. 若用手放入時，將藥粒用手指推送入陰道 1~2 指節深即可。
6. 若栓劑不易置入，可將栓劑迅速放入水中(或塗抹凡士林)濕潤。
7. 塞入後保持原來姿勢躺至少15分鐘，以防止栓劑被排出。
8. 每次使用完後，將送藥器用肥皂及清水充分洗淨，並置於乾淨處晾乾保存。
9. 使用完必再次清洗雙手。

■ 注意事項

1. 避免性交或使用保險套，以免再感染。
2. 非醫師指示，懷孕或哺乳婦女請不要使用。
3. 月經期間仍可使用。
4. 使用後可能會有分泌物，可使用護墊。
5. 若使用後病情惡化或有癢、刺激感時，應立即就醫。
6. 一般可在睡前或醫師指示時間使用。
7. 陰道栓劑應防潮，保存在小孩不易拿到及陰涼處。
8. 栓劑變軟無法塞入時，可將栓劑放置冰箱冷藏約 30 分鐘或除去外包裝前置於冷水使其變硬。

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-9013

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮