

# 藥品使用指導單

## 潤娃®易利達乾粉吸入器 Relvar Ellipta®inhaler

### ■ 藥品成分名

Fluticasone furoate 92 mcg、Vilanterol 22 mcg

### ■ 作用

- 可減少氣管發炎並使支氣管擴張，做為慢性阻塞性肺病及氣喘之維持治療

### ■ 用法



1. 第一次使用時，請將開口朝上，並將蓋子打開，請確認是否有聽到開蓋聲。

2. 慢慢呼氣後把氣吐完，白色吸嘴以嘴唇含緊對準喉頭，確認瓶身保持直立。

3. 透過嘴巴慢慢吸氣，將藥物吸入。



4. 持續吸氣至吸飽為止，並屏住呼吸10秒鐘。

5. 在開始吐氣之前，鬆開手指並將吸入器嘴唇移開。

6. 吸入藥物後，請將開口擦拭乾淨，並推回蓋子，請確認聽到閉蓋聲。



7. 吸入後請以清水漱口2次，以減少口咽部鵝口瘡發生風險。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 注意事項

- 1.請在每天同一時間用藥。
- 2.每次使用完後需漱口，漱口能有效降低聲音嘶啞及鵝口瘡等副作用的發生。
- 3.因為所投予的粉末相當微量，您僅需依照前述方式使用，應可確保藥品已被吸入。
- 4.請勿冷藏或冷凍，應儲存於室溫，不宜儲存於潮濕環境避免結霜，請避免陽光直射（不可高於50°C）。

## ■ 如何知道藥品存量？

當視窗數字顯示小於10時，提醒您該回診囉！  
當視窗顯示為0，區塊為紅色時，藥物已全部用完。

## ■ 如何清潔？

至少一星期清理吸入器一次。請以乾淨的酒精棉片或衛生紙擦拭吹嘴即可，且不須以吹風機吹乾。藥罐不可放入水中。

參考資料：

- 1. Micromedex
- 2. 藥品仿單
  
- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130，8132
- 制訂單位/日期：藥劑部/2021.01
- PFS-7200-9027

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮