

腫瘤藥物指導單張

癌思停(Avastin®)

■ 藥品成分名

Bevacizumab

■ 作用機轉

癌思停® 是一種單株抗體類的標靶藥物，可選擇性和血管內皮生長因子結合，減少腫瘤的微血管形成，達到延緩腫瘤生長的效果。

■ 療程及給藥時間

每二~三周一次，靜脈輸注30分鐘

■ 副作用

噁心嘔吐：輕度致吐(有<10%的病人會發生嘔吐)

常見副作用：

可能立即發生(幾小時至幾天)
過敏反應、頭痛
較快發生(幾天至數周)
腹瀉、食慾減退、血栓、疲勞、皮疹、蛋白尿、高血壓、影響傷口癒合
➢ 高血壓：隨著接受治療的次數增加，血壓可能會有變化，每人血壓變化程度不一。如有高血壓病史請進行血壓監測，如果血壓太高，醫生會視情況給您高血壓的藥物控制。
➢ 影響傷口癒合：要進行手術計畫、拔牙請先告知醫師。

罕見但嚴重之副作用：

- 腸穿孔－如出現劇烈腹痛、發燒等症狀請盡速回院
- 出血－出現黑便、瘀青、流鼻血、咳血等情請盡速回院

■ 甚麼情況我需要回醫院？

1. 發燒超過38度、寒顫
2. 呼吸短促、呼吸困難、下肢紅腫疼痛
3. 無法控制的嘔吐或腹瀉
4. 嚴重腹痛
5. 異常出血(血尿、血便、流鼻血等)

此單張並不包含所有衛教資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。
化療諮詢電話：(02) 27372181 轉 8442/8444 北醫附醫藥劑部關心您



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮