臺北醫學大學附設醫院 復健醫學部語言治療組

構音障礙

兒童構音障礙(臭乳呆)

即一般人所說的"臭乳呆"(台語),它是指一個人的構音動作,在構音過程中發生錯誤或困難,造成咬音不準確,語音清晰度不良的情況。構音障礙是常見的兒童語言問題,一般認為經過適當的語言治療,構音障礙可以完全改善。如果二歲半時發現有構音障礙問題,必須到復健科接受構音方面的評估及治療。一般來說,最慢學齡前(六至七歲)就應該到復健科接受評估及治療。

什麼年紀的小孩應該會什麼音(正常兒童的構音發展如何)?一般來說,三歲以前要能發出勺、欠、口、分、去、ろ、《、丂,三至四歲能發出니、〈、下、ち,四歲至五歲能發出丁、厶、坐、彳、戸。

造成構音障礙的原因有那些?

構音器官有問題,譬如口腔的大小形狀、舌頭與舌繫帶的長度,牙齒排列、上下顎咬合情形及唇顎裂等構音器官的問題都會造成構音障礙。

唇舌動作協調差也會造成構音異常。

聽力不好無法分辨相似的語音時,將無法準確發音。

智能不足造成學習能力差,也會影響構音能力。

人格特徵及情緒問題,如個性衝動的人講話速度快,講話快則省略或歪曲的發音也多,構音自然不正確。

構音障礙的診斷必須先瞭解患者的家庭史、疾病史以及其他相關資料,構音器官及聽力的檢查也相當重要,經過語言治療師的評估之後,若確定有構音障礙者必 須到復健科接受語言治療。

語言治療內容包括那些?

首先要明瞭的是治療計畫因人而異,只適合患者的個別需要,不會有所謂的標準治療法。

- 1. 聽辨能力訓練,區分什麼是正確的語音,什麼是錯誤的發音。
- 2. 應盡量利用患者有興趣的及生活中常遇到的事物,當作題材進行治療工作,效果相當不錯。
- 3. 除了語言治療師和患者之間的密切合作外,還應該與家人、老師、同學及朋友 合作,尤其是患者的父母親,才能使治療迅速有效。

我們關心您的健康!

臺北醫學大學附設醫院復健醫學部 02-27372181 # 1241~1244 轉 11 或 12