

病歷號

病人姓名

填表人

 本人 家屬

執行日期

完成日期

大腸直腸癌手術後化學治療的選擇



前言

一、適用患者

大腸直腸癌接受手術後的患者

二、手術後腫瘤已清除,可以不接受化學治療嗎?

化學治療(化療)是透過使用藥物對抗癌症的方法。藥物可以透過靜脈或口服進入體內,然後再進入血液輸送全身。化療的時機及組合會因病人病情的不同而不同,安排在手術前或後進行;手術前安排化療,其目的是縮小癌細胞,讓手術過程進行更順利,手術後安排化療療程,則是以提高病人的存活率為主。另外,化療藥物亦可減輕嚴重(末期)癌症病人的症狀,並延長壽命。








研究顯示

- 國際間大型醫學臨床研究顯示手術切除腫瘤後,病理報告顯示為第二期之患者,接受化療與否,對總存活率提升及復發轉移率降低並無有效差異。但根據日本國內臨床治療經驗所得之研究統計,術後病理期別為第二期且具危險因子之患者,接受口服化學治療,可降低復發轉移率。
- 術後病理報告判定為第三期之患者,則必須接受輔助性化學治療。國際間已有多項大型臨床研究及癌症治療經驗證實,術後輔助性化療,可以提高病人的存活率。大腸直腸癌是少數治癒率高的癌症,對化學治療的反應良好,而且大部分的藥物並不會造成掉髮,也不會有嚴重的噁心、嘔吐或口腔潰瘍等,通常使用一些症狀控制藥物即可處理不適的問題。



比較選項

⊕ 藥物注射化療方式有住院化療或門診化療兩種方式

住院化療	門診化療
 每兩週為一個療程	 每三週為一個療程
 每次住院接受連續性針劑化學藥物注射治療三到四天	 療程的第一天至門診接受約四小時針劑化學藥物治療後即可返家
 總共需要十二次療程，為期約半年。	 返家後患者需自行服用口服化學治療藥物持續兩週，之後休息一週再返診
	 總共需進行八個療程，總療程為期約半年。

- 若病人年紀過大，或整體身體評估狀況不佳，及第二期具危險因子的患者，可考慮投以口服劑型的化學治療藥物即可。
- 因此，每位患者可依照自己的狀況與醫師討論，再決定該選擇哪一種方式較為有利及方便。



選擇您考量的在意因素

⊕ 請圈選您選擇化療方式的在意因素有什麼？以及在意程度？

	在意程度					
	非常 不在意	→				非常 在意
病患自主意願	0	1	2	3	4	5
經濟考量因素	0	1	2	3	4	5
照護的方便性	0	1	2	3	4	5
自我照護風險	0	1	2	3	4	5
病人的舒適性	0	1	2	3	4	5
病人可存活時間	0	1	2	3	4	5
私人保險	0	1	2	3	4	5



測驗您自己

⊕ 測驗您對治療方式的認知有多少？

- Q1 接受化學治療後，會減少腫瘤復發機率。 對 不對 不清楚
- Q2 接受化學治療後，可以增加病患存活率。 對 不對 不清楚
- Q3 接受化學治療後，會有嚴重的副作用，如：
噁心、嘔吐、無法進食、體重減輕。 對 不對 不清楚



您的決定

⊕ 您現在確認好接受化學治療了嗎？

- 接受化學治療
- 不接受化學治療

⊕ 若您接受化學治療，您要選擇哪種方式呢？

- 接受門診化學治療
- 接受住院化學治療
- 目前無法決定，想再與我的家人或醫療團隊討論
- 目前無法決定，對於以上方式，我想要再瞭解更多，我的問題有：

醫病共享決策之經驗調查

請問您此次與醫療人員進行醫病共享決策的整體過程中，圈出下列問題中您認同的數字。

我認為利用醫病共享決策的方式，能.....		非常 不同意	不同意	普通	同意	非常 同意
1	幫助我瞭解可以選擇的醫療方式	1	2	3	4	5
2	提供我機會向醫療人員提出我的疑問	1	2	3	4	5
3	促進我對醫療過程的參與	1	2	3	4	5
4	促進我和醫療人員間的溝通	1	2	3	4	5
5	讓我更信任醫療人員對我的醫療處置	1	2	3	4	5

完成本份評估，請交回給醫療人員，若有問題可再與您的主治醫師討論。