

超音波導引神經阻斷術

Q1: 什麼是超音波導引神經阻斷術？

術後由麻醉醫師在超音波導引下，在患側支配傷口神經的周圍，精準注射長效局部麻醉藥物，以阻斷痛覺達到止痛效果，卻不會影響肌力。

Q2: 神經阻斷術的止痛效果可以維持多久？

依照病人體質和手術大小，止痛效果約可持續18-30小時，且可於第2-3天後再追加注射，達到術後止痛。

Q3: 什麼狀況不能使用神經阻斷術？

對局部麻醉藥過敏、有嚴重出血傾向、注射處部分有感染情況者不適用。

Q4: 神經阻斷術會有風險嗎？

- 神經阻斷術是一種安全、有效的止痛方式。
- 最常見的副作用為注射處瘀青，其他包括：腿部血腫、局部麻醉藥物反應，或神經損傷、...等。
- 這些副作用在目前應用多重監測方式，以及使用超音波引導精確注射技術下，已不常見。

Q5: 費用

以神經阻斷術作為術後止痛方式，目前並不包含在健保給付的範圍，相關費用請洽本院麻醉團隊。

- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8310
- 制訂單位 / 日期：麻醉科 / 108.05.10
- F-5100-050

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮