

預防手術後噁心嘔吐-強效止吐劑 (Otril)

Q1: 為何有些病人麻醉甦醒需要使用止吐劑？

- 手術後24小時內的噁心和嘔吐是手術後最常見的併發症之一，約有20~30%的病人會出現。
- 嚴重噁心、嘔吐除了不舒服外，還會牽動手術傷口造成傷口疼痛，嚴重者可致傷口縫合斷裂，故常需使用止吐劑才能緩解。

Q2: 容易造成手術後嚴重噁心嘔吐的原因？

原因眾多，可歸類為：

- 病人因素：女性、非吸菸者、患有動暈症（motion sickness）或過去有術後噁心嘔吐病史者，與出現術後噁心嘔吐有高度相關。
- 麻醉因素：使用吸入性麻醉劑進行全身麻醉、術後使用鴉片類止痛藥物、全身麻醉時間長（大於1小時）。
- 手術因素：據統計，乳房手術、腹部、婦科以及腹腔鏡手術，約有5至6成比例病人出現術後噁心嘔吐的情形；其他如斜視矯正手術、中耳手術等也被認為與術後噁心嘔吐有關。

Q3: 既然手術後常發生噁心、嘔吐的情形，沒有健保藥物可以預防或治療嗎？

- 麻醉前，麻醉醫師會給予健保藥物(皮質類固醇, Dexamethasone) 做為預防，可以降低10~20%的噁心、嘔吐發生機率。
- 但對於容易造成嚴重噁心、嘔吐的病人或麻醉、手術類型者，仍建議使用效果極佳的嘔速停靜脈注射劑 (Otril)來治療，但此藥物目前並不包含在健保給付的範圍。

Q4: 嘔速停靜脈注射劑 (Otril)可以等到噁心、嘔吐無法忍受時才使用嗎？需要打幾劑？

- 嘔速停靜脈注射劑 (Otril) 建議在手術期間開始給予效果較佳。
- 等待症狀嚴重才使用，病人則需忍受不舒服至藥物效用發揮，通常為20-30分鐘。
- 由於藥物作用可維持24小時，故預防手術後噁心嘔吐通常給予1劑即可改善。

■ 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8310

■ 制訂單位/日期：麻醉科/108.05.10 實際治療以醫師診治為主

■ F-5100-055



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮