病歷號		給表日期	
填寫人	□本人 □家屬	回收日期	

外傷性顴骨（Zygomatic fracture）骨折手術與否的選擇

顴骨骨折可以選擇不手術嗎？

✧前言

顴骨與上頜骨相連，牙槽形成顴上頜骨支撐。顴上頜縫合線延伸至眶下緣：從側面看，顱骨附著在顳骨（Temporal bone）上，形成顴弓。顴骨是形成面部外觀的骨骼之一，是中臉的主要結構及支撐。



✧適用對象 / 適用狀況

成人外傷性顏面骨骨折

✧疾病簡介

顴骨骨折是顏面骨折中第二常見的骨折，僅次於鼻骨。顴骨和顴弓骨折的患者，其上覆軟組織經常會出現瘀斑、水腫和壓痛。顴骨骨折可能會因骨折處凹陷導致眼球肌肉凹陷、外觀塌陷等問題，骨折的顴骨弓會撞擊顳肌和下頜冠突而影響咀嚼，導致咀嚼疼痛，甚至進一步影響顏面神經，導致感覺異常。

✧比較選項：手術與否的選擇

內科治療	比較選項	手術治療
一般止痛藥物	金錢	健保手術
症狀治療，依人而定	住院天數	術後2~3天後即可返家
依受傷時塌陷程度而定	顏面外觀	手術矯正，骨頭復位
顴骨位移可能隨咀嚼活動時疼痛	疼痛時間	術後骨骼復位，傷口疼痛約2~4天
骨骼自行癒合約2~4週	傷口癒合	骨折處手術固定，加速癒合
顏面神經損傷修復，依人而定	神經修復	手術後減少再次損傷的機會

1. 若病人年紀過大、眼球神經損傷或整體身體評估狀況不佳者，可考慮內科治療即可。

2. 每位患者可依照自己的狀況與醫師討論，再決定該選擇哪一種方式較為有利。

3. 若顴骨骨折已導致牙關緊閉、複視或視神經損傷則需優先考慮手術。

✧選擇您考量的在意因素

考量項目	最不重要		重要程度 →			非常重要
病患自主意願	0	1	2	3	4	5
經濟考量因素	0	1	2	3	4	5
照護的方便性	0	1	2	3	4	5
後續恢復程度	0	1	2	3	4	5
自我照護風險	0	1	2	3	4	5
病人的舒適性	0	1	2	3	4	5
家庭工作影響	0	1	2	3	4	5

✧對於以上提供的資訊，您是否已經了解呢？

Q1	接受手術後，能改善顏面外觀及對稱性。	□ 了解	□ 不確定
Q2	接受手術後，能減少影響咀嚼或咀嚼時的疼痛問題。	□ 了解	□ 不確定
Q3	若未手術，可能產生的合併症，如：眼球肌肉凹陷、面部外觀塌陷或咀嚼疼痛等。	□ 了解	□ 不確定

✧ 您的決定

➢ 您現在決定好接受手術嗎？

□ **接受**手術治療。　　□ **不接受**手術治療。

□ 目前無法決定，對於以上方式，我想要再瞭解更多，我的問題有：

_____

✧ 為提升本院醫病共享決策之推動品質，懇請您就此次使用醫病共享輔助決策工具的經驗，提供寶貴意見，回答內容均為保密，敬請安心作答。

1. 您此刻是否已經做好醫療選項(治療方案)的決定?

□我目前仍無法決定。

□我在使用本輔助工具前已做好決定。

□我在使用本輔助工具前有決定，但使用本輔助工具後改變決定的選項。

□我在使用本輔助工具後才做好決定。

我認為利用醫病共享決策的方式，能.....		非常不同意	不同意	普通	同意	非常同意
1	能充分提供我目前面對醫療決策的相關知識	1	2	3	4	5
2	助於我更了解目前面對的各種醫療選項優、缺點內容	1	2	3	4	5
3	幫助我瞭解可以選擇的醫療方式	1	2	3	4	5
4	提供我有機會向醫療人員提出我的疑問	1	2	3	4	5
5	讓我更信任醫療人員對我的醫療處置	1	2	3	4	5
6	幫助我做出最適合的醫療選擇	1	2	3	4	5

	請問本次醫療決策選擇的確認	否	是
1	您是否對您的最佳選擇感到確定?	0	1
2	您是否知道每個選項的好處與風險?	0	1
3	您是否清楚哪些好處與風險對您是最重要的?	0	1
4	您是否有的得到足夠的幫助、意見和支持去做選擇?	0	1

完成以上評估後，您可以攜帶此份結果與您的主治醫師討論