



藥物不良反應工作小組-藥物安全警訊公告 115.04

含 doxycycline、ceftriaxone、benzylpenicillin 成分藥品安全資訊

摘要說明:

2026/2/6 瑞士 Swissmedic 發布使用抗生素（如：doxycycline、ceftriaxone、benzylpenicillin）治療螺旋體感染可能導致病人發生赫氏反應 (Jarisch-Herxheimer reaction) 相關安全性資訊。

網址：

<https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/humanarzneimittel/market-surveillance/pharmacovigilance/vigilance-news/jarisch-herxheimer-reaktion.html>

藥品安全資訊描述:

1. 在開始使用抗生素治療螺旋體感染的 24 小時內可能發生寒顫、體溫上升、頭痛、肌肉痛、皮疹惡化及其他症狀，此被稱為赫氏反應 (Jarisch-Herxheimer reaction)，其歸因於治療時大量病原體崩解和螺旋體脂蛋白的釋放，導致免疫系統活化及發炎反應。赫氏反應最常發生於患有早期梅毒的病人，而部分因螺旋體感染的病人，也會在開始抗生素治療後產生此反應。
2. 瑞士 Swissmedic 曾接獲患有鉤端螺旋體病 (leptospirosis) 的病人使用 ceftriaxone 治療後，發生赫氏反應之文獻通報案例。在 WHO 全球不良反應通報資料庫中，大部分發生赫氏反應的案例與通報使用 doxycycline、ceftriaxone 和 benzylpenicillin 有關。
3. 赫氏反應通常為自限性，症狀會自行緩解，亦可針對症狀治療；發生赫氏反應時，**不應**停止抗生素的治療，因這表示抗生素治療有效。

醫療人員注意事項:

1. 食品藥物管理署現正評估是否採取進一步風險管控措施。

院內品項:

1. Doxynin Capsules 100mg (doxycycline) 得喜寧膠囊
2. Ceftriaxone 2g (ceftriaxone) 西特亞靜脈乾粉注射劑

藥物不良反應工作小組 敬啟
臨床藥學組 李玟瑾 藥師(分機 7322)