



藥物不良反應工作小組藥物安全警訊通告 109.10

Fentanyl 成分穿皮貼片劑型藥品安全資訊

摘要說明：

2020/9/23 英國醫藥品管理局(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) 發布安全資訊，針對鴉片類藥品用於治療**非癌痛病人**之風險進行評估後，建議將 fentanyl 成分穿皮貼片劑型藥品**禁用於**未曾使用過鴉片類藥品(opioid-naive)的病人。

藥品安全資訊描述：

1. Fentanyl 為一種強效鴉片類止痛藥，fentanyl 貼片劑型藥品 12µg/hr 之劑量相當於每日高達 45mg 之口服嗎啡劑量。
2. 截至 2020 年 5 月英國接獲 13 件未曾使用過鴉片類藥品的病人，使用 fentanyl 藥品後發生**呼吸抑制**之通報案例。英國人體藥物委員會(Commission on Human Medicines, CHM)建議加強現有警語，且將**未曾使用過**鴉片類藥品的**非癌症**病人列為 fentanyl 穿皮貼片劑型藥品之禁忌症。

醫療人員注意事項：

1. 處方 fentanyl 穿皮貼片劑型藥品前，應先審慎評估病人病史及用藥資訊(例如：是否對鴉片類藥品具耐受性)。
2. 處方 fentanyl 穿皮貼片劑型藥品時，請提醒病人以下重要資訊：
 - 勿使用超過仿單建議之處方劑量。
 - 遵照貼片之正確使用頻率，避免觸碰到貼片的黏著面並於完成黏貼後用清水洗手。
 - 勿裁剪貼片及避免貼片暴露於高溫處，包括：熱水(泡澡及淋浴)。
 - 使用新貼片前應確保舊貼片已移除。
 - 遵循仿單之使用說明，安全地貯存及適當的處理已使用過或不需之貼片。
 - 特別重要的是將貼片置於遠離兒童視線及置於兒童無法觸及之處。
2. 讓病人及照護者了解 fentanyl 過量之症狀及徵兆，並建議若病人疑似有 fentanyl 過量之情形應盡快尋求醫療協助。
3. 提醒病人即使在治療劑量下，長期使用鴉片類藥品治療非癌疼痛(超過 3 個月)也會增加依賴性及成癮性之風險。

院內品項：

1. Durogesic 12mcg/hr D-TRANS 多瑞喜穿皮貼片
2. Fentanyl 25mcg Transdermal Patch 吩坦尼穿皮貼片
3. FENTANYL 50mcg Transdermal Patch 吩坦尼穿皮貼片

全文網址：

<https://www.gov.uk/drug-safety-update/transdermal-fentanyl-patches-for-non-cancer-pain-do-not-use-in-opioid-naive-patients>