臺北醫學大學附設醫院
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥物不良反應工作小組藥物安全警訊通告 108.01

美國食品藥物管理局(FDA)用藥安全資訊風險溝通：

Fluoroquinolones 抗生素增加罕見， 但嚴重的主動脈破裂或撕裂事件

摘要說明:

美國食品藥物管理局(FDA) 公告 fluoroquinolones 抗生素增加罕見， 但嚴重的主動脈破裂或撕裂事件的發生。這些稱為主動脈撕裂(aortic dissections)或主動脈瘤的破裂(ruptures of aortic aneurysm)可導致危險的出血，甚至死亡。 這類不良事件可以發生經口服或注射給予的全身性 fluoroquinolones 使用。

醫療人員注意事項:

1) 以下高風險病患，若還有其他治療用藥選擇，避免開立使用 fluoroquinolones 抗生素，
   (a) 有主動脈瘤的病患
   (b) 有主動脈瘤風險的病患，包括：周邊動脈疾病(peripheral atherosclerotic vascular diseases)、高血壓, 马凡氏症候群(Marfan syndrome)及埃勒斯-當洛二氏症候群(Ehlers-Danlos syndrome)等基因相關疾病狀況、以及老年人
2) 醫療人員需提醒病人及其照護者，若出現主動脈瘤相關的症狀，必須立即尋求醫療協助，這些症狀包括：突發性，且持續嚴重的肚子、胸口或背痛。
3) 若病人出現任何疑似主動脈瘤撕裂或破裂的症狀，請立即停用 fluoroquinolones 抗生素。
4) 醫療人員若懷疑病人因為使用藥品導致不良反應發生時，請立即通報藥物不良反應。

院內品項：

Cravit® (Levofloxacin) 500mg Tablet 可樂必妥膜衣錠
Cravit® (Levofloxacin) 250mg/50ml/bot 可樂必妥靜脈輸液
Cravit® (Levofloxacin 5mg/ml) 5ml Ophthalmic Solution 可樂必妥眼藥水
Ciproxin® (Ciprofloxacin) 250mg Tablet 速博新膜衣錠
Ciproxin® (Ciprofloxacin) 200mg/100ml Infusion Solution 速博新靜脈輸液
Avelox® (Moxifloxacin) 400mg Tablet 威洛速膜衣錠
Avelox® (Moxifloxacin) 400mg/250ml Infusion Solution 威洛速靜脈輸注液

藥物不良反應工作小組 敬啟
臨床藥學組 郭沁怡 藥師
(分機 8444)