

產後出血之動脈栓塞術衛教單

■手術簡介

動脈栓塞術是以血管攝影的方式，運用導管沿著動脈尋找出血點，再經由導管注入栓塞物質，塞住出血的位置。栓塞物約數週內會慢慢溶解，出血點也會自行修復並再度恢復供血。


■術後常見症狀

此療程目的為減緩或阻斷血液供應，會造成局部組織暫時缺血及缺氧，可能會引起如發燒、腹痛、血尿、血便及栓塞部位疼痛。


■術前的注意事項

- 術前 4 小時禁食。
- 填寫同意書，表示您同意該項檢查(治療)。
- 會為您將導管放置處的毛髮刮除，以降低感染風險。
- 請將身上金屬物品取下，以免干擾檢查。
- 若對含碘對比劑有嚴重過敏史，請務必提前告知醫護人員。
- 請親友陪同前來，方便照顧。

■血管攝影儀及動脈栓塞術示意圖



栓塞前



栓塞後

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■檢查與治療過程：

- 工作人員以推床方式將您帶至影像醫學部血管攝影室。
- 手術由介入放射科醫師操作。
- 醫師會在您大腿內側施打局部麻醉以減輕疼痛，透過股動脈穿刺，置入導管至子宮動脈，並注射對比劑進行血管攝影定位出血點，再施打栓塞物質阻斷血流止血。

■術後注意事項

- 術後請配合絕對臥床 8 小時，穿刺部位用 2 公斤砂袋壓迫止血4小時，勿彎曲或用力。
- 請注意傷口有無滲血及血腫情形，有異常請告知醫護人員，隔日會為您除去穿刺部位之膠布。
- 如果手術後出現劇烈或異常的疼痛、持續不退的發燒、腸胃道症狀（如嚴重腹痛、嘔吐）、排尿困難或皮膚潰爛，請立即告知醫護人員。

■複習一下(共3題，是非題)

問題1：()請注意傷口滲血及血腫情形屬正常現象

問題2：()術後需配合絕對臥床 8 小時

問題3：()術前需禁食4個小時。

正確答案

問題1：X 問題2： 問題3：

參考資料：

University Hospital of morcambe bay-Aftercare instructions: vacuum assisted biopsy

<https://www.uhmb.nhs.uk/our-services/patient-information-leaflets/radiology-aftercare-instructions-vacuum-assisted-biopsy>

諮詢電話：(02)2737-2181 分機1129

制訂單位 / 制(修)訂日期：影醫部醫學部/1140911

PFS-5500-003

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮