

# Leuplin depot 注射

## ■ 適應症

- 子宮內膜異位症
- 手術前縮小肌瘤，改善貧血
- 子宮內膜異位症術後：減少復發率
- 停經前乳癌輔助療法
- 人工受孕前輔助用藥
- 中樞性早熟（3.75mg）

## ■ 用法

- 注射於手臂、腹部、臀部等部位，皮下注射，注射後勿搓揉。
- Leuplin depot 3.75mg，建議治療時間為6個月，每隔28天注射一次。
- Leuplin depot 11.25mg僅限於18歲以上之病患，建議治療時間為6個月，每3個月注射一次。

## ■ 注射時間

- 第一劑須在月經來潮三天內施打或依醫師囑咐注射，已有『藥物』及『注射單』者，至注射室時無需掛號。（注射當日請記得一起攜帶）
- 第三醫療大樓1樓注射室施打時間為：  
周一至周五(09:00-20:00)和周六(09:00-12:00)

## ■ 副作用

- 注射部位偶有輕微瘀血，可能有熱潮紅、夜間盜汗、頭痛、陰道乾澀與胸圍減小等停經症候群，一旦停藥副作用即會改善

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 假性停經後護理

- 熱潮紅：降低室溫至19-20度C、適當的運動、維他命E的補充(每天 800IU)。
- 陰道不適：醫師建議下使用陰道用雌激素藥品，如:陰道用乳霜、藥片或 Estring；水溶性陰道潤滑液。
- 骨質疏鬆：補充鈣質高的牛奶、小魚乾、排骨湯等高鈣食物。

## ■ 保存方式

- 儲存於25度以下，勿陽光直射，無須放置冰箱

## ■ 備註

- 尚未停經者在使用藥物治療後，月經會於最後一劑的45-60天來潮，無生育計畫者仍須採取避孕措施。
- 施打針劑後因為卵巢功能在下降中，屬不穩定狀態，少數人在施打第一劑後約2週會有出血情形，血量會較經期多，若影響生活可回診拿藥止血，施打第二劑後就不會有此情形了。

參考資料：

王懷麟（2013）· 巧克力囊腫對於生育力的影響· 中華民國內膜異位症婦女協會會刊，20（11），18-19  
賴芳宇、陳加祥、呂佳蓁（2014）· 停經症候群治療新知· 家庭醫學與基層醫療，29（12），290-295

- 諮詢電話:(02)2737-2181 分機 8513
- 制訂單位 / 日期:5A病房/107.04.20
- PFS-8100-238

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮