

# (胸內)支氣管鏡無痛麻醉諮詢衛教單

## ■ 目的

支氣管鏡檢查時給予受檢者適量的麻醉鎮靜藥物，以減輕受檢時的焦慮、不安與疼痛。其麻醉鎮靜藥物種類與劑量，比起一般手術所使用的麻醉藥物都輕了許多，全程皆有胸腔內科醫師及技術員照顧，提供受檢者另一種舒適安全選擇。

## ■ 檢查時間

- 請參照支氣管鏡檢查衛教單。
- 檢查時間依據病情不同可能有所差異，敬請您耐心等待。

## ■ 檢查前準備

- 詳閱並填妥【無痛無感鏡檢檢查治療說明暨同意書】。
- 為安全考量，檢查當日務必成年親友陪同（不含當日同時接受鎮靜麻醉者），無人陪同者將改為有感鏡檢，敬請見諒！並請勿駕車或騎乘機車來院。
- 檢查前，請先卸除隱形眼鏡、活動假牙、指甲油、水晶指甲及口紅。
- 檢查當日請著寬鬆衣服（怕冷者請另加外套），以便注射靜脈留置針及測量血壓。請著止滑平底鞋，以預防跌倒。
- 預訂檢查時間前兩小時請勿喝水（包含牛奶與混濁性液體）。

## ■ 檢查過程說明

- 請參照支氣管鏡檢查衛教單

## ■ 檢查後注意事項

- 檢查後需在恢復室休息、觀察約30分鐘，或視狀況延長。
- 受檢者確定無頭暈、噁心、嘔吐症狀，採漸進式下床，以預防低血壓及跌倒。
- 漸進式下床步驟：平躺 → 半坐臥 → 坐起 → 站立 → 行走
  1. 受檢者半坐臥（45度以上）至無頭暈或不適（約3~5分鐘）後坐起，並可保持上身直立不搖晃。
  2. 由家屬協助穿鞋後試站立，確認無頭暈或不適。
  3. 家屬扶持起身向前走3~5步後，轉180度，走回原處。
  4. 以上任何姿勢轉換時需緩慢，若有頭暈或不適，由家屬扶持坐在椅子上休息，適時再重覆以上3-4步驟。
- 技術員幫受檢者拔除靜脈導管後，才可離開檢查室，返家休息。
- 如您目前正在哺乳，檢查後24小時內請勿餵食母乳。
- 請於5~7個工作天後，依照醫師掛號時間回診看報告。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主

參考資料：

- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8646
- 制訂單位/日期：聯合檢查中心胸腔功能檢查室/112.05.25
- PFS-0330-003

