局部麻醉後注意事項

■ 兒童：

- 麻藥的消退時間是因人、因所做療程而異的，大致上在30 分鐘至3個小時，家長可以詢問是否仍有”怪怪”或”胖胖”的感覺，以藉此判斷。
- 在麻藥尚未消退之前，請勿給予小朋友食物，因咀嚼會造成小朋友無意間咬傷嘴唇或舌頭，造成外傷及麻藥退去後的疼痛。若是期間小朋友口渴或是有一點餓，可以杯子或吸管喝一些飲料。
- 在麻藥退去前，小朋友可能因為覺得有麻藥的地方怪怪的，會去吸吮或是用牙齒咬，家長在看到此動作時，一定要制止，或是讓小朋友咬一塊紗布或棉卷預防。
- 小朋友若不慎咬傷嘴唇或臉頰，請家長保持患部清潔，並塗抹口內膏以利傷口癒合。

■ 成人：

- 麻藥的消退時間是因人、因所做療程而異的，大致上約為 2 至 3 小時。
- 在麻藥尚未消退之前，請儘量不要吃東西，以防無意間咬傷嘴唇或舌頭。若口渴或有饑餓感，可以杯子或吸管喝一些飲料。
- 若不慎咬傷嘴唇或舌頭等軟組織，可以塗抹口內膏以利傷口癒合。

諮詢電話:：(02)27372181 分機3211-7
制訂單位/制(修)訂日期:口腔顎顏面外科/1150305
PFS-3900-006

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主
以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮