

舒眠鎮靜止痛前注意事項

■ 什麼是牙科舒眠鎮靜止痛：

牙科檢查治療時，經由靜脈點滴給予受檢者適量的麻醉鎮靜藥物，以減輕治療時的焦慮、不安與疼痛。其麻醉鎮靜藥物種類與劑量，比起一般手術所使用的麻醉藥物都少些，且全程皆有麻醉醫師照顧，提供接受治療者另一種舒適安全的選擇。

■ 禁食規定：

麻醉鎮靜藥物會減弱人體正常的保護性反射，若在過程中發生嘔吐，很容易將嘔吐物吸入肺中，引起吸入性肺炎，可能造成嚴重後果(如:缺氧或死亡等)。為預防吸入性肺炎，除經特別指示的服藥外，進行舒眠鎮靜前，需依食物不同性質，配合禁食時間之規定：

- 清水：2 小時
- 輕食(簡單、清淡且低熱量)：6 小時
- 其他油炸、含肉類或非母乳配方：8 小時

■ 事前檢查：

請於舒眠鎮靜前七~十天持醫師開立檢驗單(心電圖及抽血單)至第三醫療大樓一樓檢驗科及二樓心電圖室進行檢查並至三樓麻醉諮詢室進行麻醉前評估。



■ 評估：

進行舒眠鎮靜前二~三天會由護理師進行電話聯繫訪查，如有特殊病史(如:心臟病、氣喘、食物或藥物過敏等)請先告知；術前若有感冒、扁桃腺炎…等，請儘早治療並主動聯繫牙科護理師，鎮靜當日若出現發燒、呼吸急促、濃稠鼻涕，則不適合進行舒眠鎮靜，症狀輕微者，則在麻醉醫師評估後，決定是否適合進行舒眠鎮靜。

■ 當日規定：

治療當日請著寬鬆衣服、平底鞋，並去除口紅、指甲油(包含水晶指甲)，務必要有行動能力正常之成年親友(建議兩名)陪同，為了顧及病人安全，若無親友陪同則無法進行舒眠麻醉治療。

■ 兒童：

年齡較小之孩童，請準備尿布以及貼身小物(例如:玩偶及被子)，以增進其安全感，並於鎮靜後禦寒。若獨自開車載孩童回家，請準備兒童安全座椅。

■ 過敏告知：

對大豆、花生、沙拉油及蛋白過敏者，請務必告知醫護人員。若有其他系統性疾病、鼻過敏，亦請告知醫護人員。

諮詢電話：(02)27372181分機3211-1
制訂單位/制(修)定日期：兒童牙科/1150305
PFS-3900-010

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮