固定假牙注意事項

■ 使用注意事項:

- 臨時假牙使用期間,由於臨時假牙材質強度較弱,請小心使用，不要啃食太堅硬或是太黏的食物，以免造成臨時假牙破損斷裂或鬆脫。若臨時假牙破損斷裂或鬆脫，應取下保存，回門診交由醫師進一步處理。
- 治療期間若有任何不適之現象，如牙齒疼痛、搖動、咬合不適或咬到臉頰或舌頭，請馬上告知醫護人員。

■ 暫黏注意事項：

- 固定膺復假牙治療期間，常需要暫黏試用固定假牙，由於暫時黏合劑強度較弱，有時會造成固定假牙鬆動，固定假牙暫黏鬆動後一定要取下保存，並馬上回診處理，以防吞入及齲齒。
- 特別在植牙膺復物試戴期間，由於植牙無牙周韌帶來吸收咬合壓力，因此咬合力大過於黏劑強度或螺絲緊度，就會造成假牙鬆脫，要特別小心，一旦植牙膺復物鬆脫一定要馬上回診處理。
- 單顆牙冠在暫黏時期，於內側通常有一小珠珠，是為了回診時方便取下，請保持該區清潔。

■ 永久黏合注意事項：

黏合劑通常在黏合後 24 小時才會達到最大強度，因此建議患者在24 小時內先不要使用該黏合膺復物咀嚼。

■ 固定膺復假牙的保養方式:

- 膺復假牙、植牙及牙齒請用牙刷清潔乾淨。
- 牙縫請用牙線或牙間刷清潔乾淨。

- 橋體與支柱牙之間，請用牙線穿引器將牙線穿過，清潔橋體與支柱牙之間的縫隙；若橋體與支柱牙牙縫很大，也可用牙間刷來清潔。

■ 贋復假牙製作完成後，至少每六個月要回診檢查。

諮詢電話：(02)27372181 分機3211-2
(02)27372181 分機3211-3
(02)27372181 分機3211-4
(02)27372181 分機3211-5

制訂單位/制(修)定日期:家庭牙科、牙髓病科、牙周病科、贋復牙科/1150305
PFS-3900-015