

藥品使用指導單

立除痛[®]錠 (Utraphen[®] 37.5/325 mg)

■ 藥品成分名

Tramadol 37.5 mg, acetaminophen 325 mg

■ 藥品外觀

淡黃色橢圓形錠劑；標記：[STD][755]

■ 作用

緩解使用非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重性疼痛

■ 用法

成人劑量通常為每四至六小時，服用一至兩錠，視個別狀況調整劑量；一天最多服用八錠。

■ 注意事項

- 之前曾對 tramadol、acetaminophen、本品其它成份或鴉片過敏的病人不能使用本品。若發生酒精、助眠藥、麻醉藥、中樞作用止痛劑、鴉片或精神藥物急性中毒亦不得使用本品。
- 肝/腎功能不全者，請事先告知醫師。
- 本品為複方，若與Acetaminophen併用時請勿超過每日最大劑量4克
- 懷孕婦女不建議使用本品；若為哺乳之婦女因病情需要而服用本品，請暫時停止哺乳。
- 若同時服用 MAO 抑制劑(某些抗憂鬱劑)、抗精神分裂症藥物，或有癲癇病史的病人以及有潛在癲癇發作危險(如頭部外傷、戒除酒精及藥物、中樞神經系統感染)的病人，服用tramadol 可能會增加癲癇發作的危險，請密切留意癲癇發生的情況。
- 由於本品可能會有嗜睡或暈眩的現象，駕車或操作危險機械的患者服用本品請小心留意。



■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：
噁心、暈眩、便秘及嗜睡。
- 較不常見不良反應包括：
焦慮、口乾、紅疹、腹痛、體重減輕、心悸或抑鬱等。
- 如果開始服用立除痛錠後出現任何讓您困擾的症狀，請暫停服用藥品並立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於30°C以下)、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.07
- PFS-7200-0009

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮